

Usa condón

El VIH se detiene si le pones barreras. El uso adecuado del condón es la mejor manera de evitar la transmisión sexual del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del sida. Ya sea en una relación estable u ocasional, el sexo sin protección es una de las principales vías de transmisión (vía sexual).

También se puede transmitir durante el parto o lactancia (vía vertical), así como por compartir agujas o jeringas (vía sanguínea).

Pruébate y trátate

Ya sea que hayas tenido sexo sin condón, estés embarazada o hayas compartido agujas o jeringas; es importante que te hagas la prueba del VIH.

En caso de que no hayas adquirido el virus (resultado No Reactivo), tu reto será permanecer libre de VIH evitando situaciones de riesgo y haciéndote la prueba cada 6 meses.

En caso de haberlo adquirido (resultado Reactivo), es importante recibir atención médica e iniciar tratamiento de inmediato.



No es lo mismo...

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

Ataca las defensas del cuerpo, debilita al sistema inmunológico que nos protege de infecciones y enfermedades.

¡Recuerda!
Si se detecta a tiempo e iniciando tratamiento oportuno lo controlas y evitas el Sida.

sida

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Etapa avanzada del VIH, es el conjunto de signos y síntomas.

La prueba detecta anticuerpos específicos contra el VIH, tiene una especificidad y sensibilidad mayor al 99%

Prueba rápida

La prueba es gratuita, confidencial y el resultado está en un minuto.

Recuerda que debes esperar 90 días después de una situación de riesgo para hacerte la prueba.

Proceso de la Prueba

1. Piquete en el dedo para obtener unas gotas de sangre
2. Se combina con soluciones
3. En 1 minuto se obtiene el resultado
4. El resultado es verbal

Todo el material es nuevo y desechable



Tipos de resultados

NO REACTIVO
No se encontraron anticuerpos de VIH.

REACTIVO
Se encontraron anticuerpos y se aplica una segunda prueba de diferente marca.

Si tienes una vida sexual activa sin protección hazte la prueba cada 3 a 6 meses.



Puerta de entrada para el VIH



¿Cómo se previene?


- Usando condón
- Sexo seguro
- Utilizando agujas nuevas
- Si tienes VIH y estás en tratamiento puedes llegar a una etapa indetectable y no transmitir el virus.

Vías de transmisión

Sexual:
Sexo anal, vaginal u oral sin protección.

Sanguínea:
Intercambio de jeringas de personas usuarias de drogas inyectables.

Vertical:
Una persona embarazada sin tratamiento puede transmitir el virus, durante el parto y durante la lactancia.



Vinculación

Si tu resultado es reactivo, te referimos y te acompañamos a los servicios de salud.

Voy contigo

AHF
MÉXICO